
OpenCourseWare

Matemáticas para la Economía I (Grados Empresa)

Paula Rosado Jiménez

Ejemplo de examen final

Junio de 2021



Exercise	1	2	3	4	5	6	Total
Points							

Duración: 2 horas.

APELLIDOS:

NOMBRE:

ID:

GRADO:

GRUPO:

(1) Sea la función $f(x) = \ln(ex - x^2)$. Se pide:

- (a) Hallar las asíntotas y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x)$.
- (b) Hallar los extremos locales y globales y la imagen de $f(x)$.
Representar la gráfica de la función.
- (c) Considerar $f_1(x)$ la función $f(x)$ restringida al intervalo donde $f(x)$ es creciente.
Representar la gráfica de la inversa de $f_1(x)$.
Sugerencia para las representaciones: utilizar que $1 < \ln 4 < 2$.
0,4 puntos apartado a); 0,4 puntos apartado b); 0,2 puntos apartado c).

a) El dominio de la función anterior es $(0, e)$.

Como f es continua en su dominio, un conjunto acotado, solo hay que estudiar las asíntotas en 0 y en e :

i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \ln(0^+) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow e^-} f(x) = \ln(0^+) = -\infty$.

Luego $f(x)$ tiene asíntota vertical en $x = 0$ y en $x = e$.

Por otro lado, como $f'(x) = \frac{e - 2x}{ex - x^2}$, se deduce que f es creciente \iff

$\iff f'(x) > 0 \iff e - 2x > 0$;

luego f es creciente en $(0, \frac{e}{2}]$. Análogamente, f es decreciente en $[\frac{e}{2}, e)$.


b) De lo anterior se deduce que no existen minimizadores, ni locales ni globales y que $x = \frac{e}{2}$ es el único maximizador local y global.

Finalmente, como $f(\frac{e}{2}) = \ln(e^2/4) = 2 - \ln 4$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, por el teorema de los valores intermedios se deduce que la imagen será $(-\infty, 2 - \ln 4]$.


Así pues, la gráfica de la función será, aproximadamente, como la figura A.

c) Como se puede apreciar, f_1 es creciente en $(0, \frac{e}{2}]$, $f_1(0^+) = -\infty$, $f_1(\frac{e}{2}) = 2 - \ln 4$,
Luego su función inversa será creciente, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_1^{-1}(x) = 0^+$, $f_1^{-1}(2 - \ln 4) = \frac{e}{2}$.

Luego su gráfica será, aproximadamente, como la figura B.



(A)



(B)

(2) Dada la función $y = f(x)$, definida de forma implícita mediante la ecuación $e^{xy} + x^2 + y^2 = 5$ en un entorno del punto $x = 2, y = 0$, se pide:

- (a) Hallar la recta tangente y el polinomio de Taylor de grado 2 de la función centrado en $a = 2$.
 (b) Representar la gráfica de f cerca del punto $x = 2, y = 0$.

Calcular, utilizando la recta tangente, el valor aproximado de $f(1,9)$ y de $f(2,1)$.

- (c) ¿Será $f(2)$ mayor, menor o igual que el valor exacto de $\frac{1}{2}(f(1,9) + f(2,1))$?
 Sugerencia para c: utilizar que $f''(2) < 0$.

0,4 puntos apartado a); 0,3 puntos apartado b); 0,3 puntos apartado c).

a) En primer lugar, calculamos la derivada primera de la función:

$$e^{xy}(y + xy') + 2x + 2yy' = 0$$

sustituyendo $x = 2, y = 0$ se deduce que $2y' + 4 = 0 \implies y'(2) = f'(2) = -2$.

Luego la ecuación de la recta tangente será: $y = P_1(x) = -2(x - 2)$.

Análogamente, calculamos la derivada segunda de la función:

$$e^{xy}(y + xy')^2 + e^{xy}(2y' + xy'') + 2 + 2(y')^2 + 2yy'' = 0$$

sustituyendo $x = 2, y = 0, y' = -2$ se deduce que $y''(2) = f''(2) = -11$.

Luego la ecuación del polinomio de Taylor será: $y = P_2(x) = -2(x - 2) - \frac{11}{2}(x - 2)^2$

b) Utilizando el polinomio de Taylor de orden 2, la gráfica de f , cerca del punto $x = 2$ será, aproximadamente, como se ve en la figura al final.


Por otro lado, utilizando la recta tangente, tenemos que:

$$f(1,9) \approx -2(-0,1) = 0,2; f(2,1) \approx -2(0,1) = -0,2.$$

c) Finalmente, como la función $f(x)$ es cóncava cerca de $x = 2, \frac{1}{2}(f(1,9) + f(2,1))$ será menor que $f(2) = 0$, como se puede ver por la gráfica o, si se prefiere, calculando aproximadamente por el polinomio de Taylor de orden 2 los valores de $f(1,9)$ y $f(2,1)$;

$$\frac{1}{2}(f(1,9) + f(2,1)) \approx -\frac{11}{2} \cdot 0,1^2$$

Llamando $f^*(2) = \frac{1}{2}(f(1,9) + f(2,1))$, el dibujo quedaría, aproximadamente, así:



(3) Sea $C(x) = \sqrt{5x^2 - 6x + 9}$ la función de costes de una compañía monopolista, donde $x \geq 1$ representa la cantidad en kilogramos de dicho producto. Se pide:

(a) Hallar la ecuación de la recta tangente a $C(x)$ en $x = 3$, y calcule una aproximación al valor de $C(3, 1)$.

(b) Supongamos ahora que la función de demanda inversa es $p(x) = 29 - bx^2$, siendo $b \neq 1, b$ próximo a 1.

Y supongamos también que en el período anterior la empresa produjo 3 unidades.

¿Aumentará o disminuirá en este período la empresa su producción?

0,5 puntos apartado a); 0,5 puntos apartado b)

a) En primer lugar, $C'(x) = \frac{10x - 6}{2\sqrt{5x^2 - 6x + 9}}$, luego $C'(3) = \frac{24}{2\sqrt{36}} = 2$.

Por otro lado, como $C(3) = 6$, la ecuación de la recta tangente será:

$$y = 6 + 2(x - 3)$$

Ahora, aproximando $C(3, 1)$ por la recta tangente, obtenemos:

$$C(3, 1) \approx 6 + 2(3, 1 - 3) = 6, 2 \text{ unidades monetarias.}$$

b) En primer lugar, los beneficios de la empresa serán:

$$B(x) = (29 - bx^2)x - C(x). \text{ Por tanto,}$$

$$B'(x) = 29 - 3bx^2 - C'(x) \implies B'(3) = 29 - 27b - C'(3) = 27(1 - b).$$

Por tanto, tendríamos dos casos:

i) si $b < 1$, entonces la empresa aumentará su producción.

ii) si $b > 1$, entonces la empresa reducirá su producción.

(4) Sea $f(x) = x^4 - 2x^2$. Se pide:

- (a) Enunciar el teorema de Bolzano de los ceros para una función g definida en un intervalo $[a, b]$.
- (b) Sea $a = -2$. Determinar b para que $f(x)$ cumpla las hipótesis de dicho teorema.
- (c) Sea $a = -2$. Determinar b para que $f(x)$ cumpla la tesis de dicho teorema.

Sugerencia para b) y c): representar la función.

0,2 puntos apartado a); 0,4 puntos apartado b); 0,4 puntos apartado c).

a) El teorema de los ceros afirma que si una función g es continua en el intervalo $[a, b]$, y si cumple que

i) $g(a) < 0 < g(b)$; o bien

ii) $g(b) < 0 < g(a)$

entonces existe un punto c en (a, b) que cumple $g(c) = 0$.

b) Como $f(-2) > 0$, entonces b debe cumplir que $f(b) < 0$; es decir, $b \in (-\sqrt{2}, 0) \cup (0, \sqrt{2})$.

c) Hace falta que exista algún cero de dicho polinomio en el intervalo (a, b) .


Por tanto, $b \in (-\sqrt{2}, \infty)$.

Observación: como $f(x) = x^2(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$, se deduce que:

i) $f(x) < 0$ si $x \in (-\sqrt{2}, 0) \cup (0, \sqrt{2})$;

ii) $f(x) > 0$ si $x \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \infty)$.

Por tanto, la gráfica de f será, aproximadamente, así:



(5) Dadas la funciones $f, g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por: $f(x) = -e^{2x}, g(x) = \frac{3}{2+x}$, se pide:

- (a) Representar aproximadamente el conjunto A , delimitado por las gráficas de dichas funciones y las rectas $x = -1, x = 1$.


Hallar, si existen, los maximales y minimales, máximo y mínimo de A .

- (b) Calcular el área del conjunto dado.

Sugerencia para a: el orden de Pareto viene dado por: $(x_0, y_0) \leq_P (x_1, y_1) \iff x_0 \leq x_1, y_0 \leq y_1$.

0,6 puntos apartado a); 0,4 puntos apartado b)

- a) $f(x)$ y $g(x)$ son decrecientes. Además, como $f(x) < 0 < g(x)$, el dibujo de A será, aproximadamente, así:



Así pues, el orden de Pareto nos describe al conjunto así:

máximo(A), mínimo (A) no existen.

minimales(A) = $\{(x, f(x)) : x \in [-1, 1]\}$

maximales(A) = $\{(x, g(x)) : x \in [-1, 1]\}$

- b) En primer lugar, por la posición de las funciones, sabemos que:

$$\text{área}(A) = \int_{-1}^1 (g(x) - f(x)) dx = \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2+x} + e^{2x} \right) dx =$$

(aplicando la regla de Barrow, obtenemos que)

$$= [3 \ln(2+x) + \frac{1}{2} e^{2x}]_{-1}^1 = (3 \ln 3 + \frac{1}{2} e^2) - (0 + \frac{1}{2} e^{-2}) =$$

$$= 3 \ln 3 + \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} e^{-2} \text{ unidades de área.}$$